

## BIOCENTRE, Laboratoire d'Analyses

**SARLAT**  
17 Av Général de Gaulle  
05 53 59 03 02



**BRIVE/BIOLAM**  
27, Av JC Rivet  
05 55 17 21 21

**TERRASSON**  
6 Av Jules Ferry  
05 53 50 00 07

**BRIVE CENTRE**  
16, Av Jean Jaurès  
05 55 74 36 13

[www.biocentre-labo.fr](http://www.biocentre-labo.fr)

Dr F CARCENAC, Dr G CARCENAC, Dr CARRERE, Dr DELORME, Me RIMPAULT, Dr PIET, Dr LABROUSSE, Dr AFOLAYAN  
SELARL BCLA au capital de 31 250 euros - RCS 301 352 1185 BERGERAC - Siège social : 17 Av, général de Gaulle - 24 200 SARLAT

### **Examen sur échantillon d'urines : cytologie simple, recherche chimique (sucre et/ou albumine...) ou recherche de Mycoplasmes, de BK, de Chlamydiae**

#### **Préconisations**

Se procurer un flacon sans poudre (pour les patients : au laboratoire ou à la pharmacie)

NB : Le flacon peut être remis dans une pochette ou un étui, accompagné d'un absorbant (en cas de fuite du flacon)

Identifier le flacon avec vos nom, prénom, date de naissance. Noter l'heure de recueil.

Recueil (si possible, à jeun) :

**Cas général** : uriner le premier jet dans les toilettes puis uriner dans le flacon (Pour examen cytologique qualitatif ou quantitatif des urines, pour dépistage et/ou dosage : pH, sucre, albumine, micro albumine, acétone, nitrate, hémoglobine, recherche de toxiques (NR) (cocaïne, cannabis, opiacés, amphétamines, métamphétamines, ecstasy), recherche de médicaments (antidépresseur tricycliques, benzodiazépines, barbituriques), antigènes solubles : Pneumocoque (NR), Legionelle)

**Recherche de BK** : restriction hydrique la nuit (ne pas boire) ; récupérer les urines le lendemain matin dans un récipient stérile. La recherche doit être effectuée 3 jours consécutifs

**Recherche de Mycoplasmes** : récupérer le 1er jet des premières urines (après rétention d'au moins 1 H) ; le prélèvement peut se faire sur un flacon avec ou sans poudre

**Recherche de *Chlamydiae sp***, le recueil doit se faire sur un **flacon sans poudre**. Ne pas faire de toilette du méat urinaire. Récupérer le 1er jet des premières urines du matin (ou après une rétention d'au moins 1 H) ; remplir le flacon stérile à moitié.

Transmettre le flacon à la pharmacie ou au laboratoire, le plus rapidement possible.

(NB : pour la glycosurie (recherche de sucre) : conserver le flacon au frigo avant transmission au laboratoire).

#### **Renseignements à noter sur la fiche de transmission/suivi médical**

Renseignements cliniques pertinents