

BIOCENTRE, Laboratoire d'Analyses

SARLAT
17 Av Général de Gaulle
05 53 59 03 02



BRIVE/BIOLAM
27, Av JC Rivet
05 55 17 21 21

TERRASSON
6 Av Jules Ferry
05 53 50 00 07

BRIVE CENTRE
16, Av Jean Jaurès
05 55 74 36 13

www.biocentre-labo.fr

Dr F CARCENAC, Dr G CARCENAC, Dr CARRERE, Dr DELORME, Me RIMPAULT, Dr PIET, Dr LABROUSSE, Dr AFOLAYAN
SELARL BCLA au capital de 31 250 euros - RCS 301 352 1185 BERGERAC - Siège social : 17 Av. général de Gaulle - 24 200 SARLAT

Recueil d'urines pour ECBU

(Examen Cyto-Bactériologique des Urines : recherche d'infection urinaire)

Préconisations générales :

Se procurer un flacon stérile (pour les patients : au laboratoire ou à la pharmacie)

Le flacon peut être remis dans une pochette, accompagné d'un absorbant (en cas de fuite du flacon). Ne pas mettre l'absorbant dans le flacon. Si le flacon contient une poudre stabilisatrice de la flore (ne pas la jeter) : ne pas mettre en contact la poudre avec les muqueuses (si c'est le cas, laver à l'eau et contacter éventuellement un médecin)

Recueil (si possible, après rétention urinaire de 4H) :

- Se laver les mains ; faire une toilette du méat (savon, lingette désinfectante)
- Commencer par éliminer le premier jet dans les toilettes puis uriner dans le flacon ; refermer soigneusement
- Le volume d'urine doit être suffisant pour dissoudre la poudre de conservation éventuelle

Identifier le flacon avec vos nom, prénom et date de naissance, heure du recueil

Amener le flacon au laboratoire ou à la pharmacie dans les **plus brefs délais**

- Si le flacon ne contient pas de poudre : il peut être conservé au frigo 12 heures
- Si le flacon contient une **poudre** : il peut être conservé durant **48H** à température ambiante

Renseignements à noter sur la fiche de transmission/suivi médical

Préciser s'il s'agit d'un prélèvement par collecteur (nourrisson, jeune enfant...), sur sonde à demeure si c'est les cas.

Préciser les renseignements cliniques (notamment si fièvre et le traitement antibiotique éventuel).

Cas particuliers : si le prescripteur demande : examen de chimie associée (sucre, albumine), recherche de BK, de Chlamydiae ou de Mycoplasmes : il faut se procurer un flacon sans poudre (il existe une fiche de préconisation spécifique)