

# BIOCENTRE, Laboratoires d'Analyses

**SARLAT**  
17, Av Général de Gaulle  
05 53 59 03 02

**TERRASSON**  
6, Av Jules Ferry  
05 53 50 00 07



**BRIVE/BIOLAM19**  
27, Av JC Rivet  
05 55 17 21 21

**BRIVE/BUFFIERE**  
16, Av Jean Jaurès  
05 55 74 36 13

www.biocentre-labo.fr

Dr F CARCENAC, Dr G CARCENAC, Dr CARRERE, Dr DELORME, Me RIMPAULT, Dr PIET, DR LABROUSSE, Me BUFFIERE, Dr AFOLAYAN

SELARL BCLA au capital de 31 250 euros - RCS 301 352 1185 BERGERAC - Siège social : 17 Av. général de Gaulle - 24 200 SARLAT

## Aide à la prescription en cas de suspicion de parasitose digestive

A évoquer devant un des signes suivants :

- Diarrhée aiguë >3 jours sans amélioration malgré traitement symptomatique
- Diarrhée 2 semaines
- Autre troubles digestifs chroniques

Chez des patients asymptomatiques :

- bilan d'une hyperéosinophilie
- bilan de retour de voyage (3-4 semaines après le retour) à partir d'une zone d'endémie

### **Prescrire :**

- « **Scotch-test anal** » : oxyures voire *Taeniasaginata* (les causes les plus fréquentes en France)
- « **Parasitologie des selles** » à 3 reprises (à 2 /3 jours d'intervalle)

Si voyage ou séjour en zone tropicale : préciser « recherche d'anguillule »\* et acheminer rapidement les selles au laboratoire

Si suspicion d'amoébose (glaires, sang) : selles émises ou laboratoire ou acheminées en moins de 30 min ; prévenir le biologiste

Si diarrhée liquide et/ou associée à de la fièvre et/ou immunodépression : préciser « recherche de cryptosporidies » et « recherche de microsporidies »

### **EN CAS DE NEGATIVITE**

<b><u>CHEZ UN PATIENT N'AYANT JAMAIS QUITTE LA FRANCE METROPOLITAINE</u></b>	<b><u>CHEZ UN PATIENT AYANT VECU OU SEJOURNE EN ZONE INTERTROPICALE</u></b>
<p><u>Si hyperéosinophilie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Selon le contexte, des <b>sérologies</b> peuvent se discuter (Toxocarose, Distomatose, Trichinellose).</li><li>- Renouveler les « <b>Parasitologie des selles</b> » à 3 reprises (à 2/3 Jours d'intervalle), 1 mois après la première série (pour tenir compte de la phase d'invasion ou de la maturation des helminthes).</li></ul>	<p><u>Si hyperéosinophilie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Selon le contexte, des <b>sérologies</b> peuvent se discuter (Bilharziose, Filariose...)</li><li>- Renouveler la « <b>Parasitologie des selles</b> » à 3 reprises (à 2/3 jours d'intervalle), 1 mois après la première série (pour tenir compte de la phase d'invasion ou de la maturation des helminthes) et préciser « <b>recherche d'anguillules</b> ».</li></ul>

**Après un traitement (1 à 3 mois selon le parasite), prescrire :**

- « **Parasitologie des selles** » à 3 reprises (à 2/3 jours d'intervalle) (pour s'assurer de l'efficacité du traitement et vérifier que d'autres parasites ne sont pas apparus)

\*Recherche systématique avant tout traitement immunosuppresseur chez un patient à risque d'anguillulose.

Ref. : In thèse médecine Dr Jean-Philippe COLLET 2011